

Raskaus ja lennonjohtotehtävissä toimiminen – ohjeita lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle ja terveydenhuoltohenkilöstölle


Raskaus on normaali fysiologinen tapahtuma, johon kuitenkin liittyy suuria anatomisia ja hormonaalisia muutoksia. Niiden vaikutuksesta toimintakyvyn menettämisen riski lisääntyy.

Lennonjohtotehtävät ovat vaativia ja sen vuoksi muutokset, jotka muissa olosuhteissa aiheuttavat vain epämukavuutta, saattavat lennonjohtotehtävissä toimivalla henkilöllä esiintyessään uhata lentoturvallisuutta. Sen vuoksi lennonjohtotehtävistä tulee pidättäytyä ja ottaa ilmailulääkäriin yhteyttä, jos tuntee vointinsa huonoksi tai jokin alla olevista oireista esiintyy ajanjaksona, jolloin lennonjohtotyöskentely muutoin on sallittua (34 ensimmäisen raskausviikon aikana).

- a heikotus, huimaus
- b pahoinvointi, oksentelu
- c anemia (hemoglobiini alle 100 g/l)
- d virtsassa esiintyy sokeria tai valkuaista
- e virtsatietulehdus
- f kaikenlaiset vuodot (myös "tiputteluvuodot")
- g vatsakipu
- h kohonnut verenpaine

Raskauden päättymisen jälkeen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee toimittaa lääkärinlausunto Trafín ilmailulääketieteen yksikköön. Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika on päättynyt, tarvitaan myös ilmailulääkäriin tarkastus. Tämän jälkeen lääketieteellinen kelpoisuustodistus voidaan saattaa uudelleen voimaan.

Lähetämme Teille kaksi kappaletta tätä ohjeistusta. Toisen voitte antaa hoitavalle lääkäriellenne tai äitiysneuvolaan liitettäväksi papereihinne. Lisätietoja saatte tarvittaessa Ilmailulääketieteen yksiköstä (AMS) puh. 020 618 6316 (klo 9 - 15).



Kari Antila, LKT, dos.

Trafi Ilmailulääketieteen yksikön johtava ilmailulääkäri