



Uudempi ohje julkaistu 28.2.2006.

Raskaus ja lennonjohtotehtävissä toimiminen – ohjeita lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle ja terveydenhuoltohenkilöstölle

Raskaus on normaali fysiologinen tapahtuma, johon kuitenkin liittyy suuria anatomisia ja hormonaalisia muutoksia. Niiden vaikutuksesta toimintakyvyn menettämisen riski lisääntyy.

Lennonjohtotehtävät ovat vaativia ja sen vuoksi muutokset, jotka muissa olosuhteissa aiheuttavat vain epämukavuutta, saattavat lennonjohtotehtävissä toimivalla henkilöllä esiintyessään uhata lentoturvallisuutta. Sen vuoksi lennonjohtotehtävistä tulee pidättäytyä ja ottaa ilmailulääkäriin yhteyttä, jos tuntee vointinsa huonoksi tai jokin alla olevista oireista esiintyy ajanjaksona, jolloin lennonjohtotyöskentely muutoin on sallittua (34 ensimmäisen raskausviikon aikana).

- a heikotus, huimaus
- b pahoinvointi, oksentelu
- c anemia (hemoglobiini alle 100 g/l)
- d virtsassa esiintyy sokeria tai valkuaista
- e virtsatietulehdus
- f kaikenlaiset vuodot (myös "tiputteluvuodot")
- g vatsakipu
- h kohonnut verenpaine

Raskauden päättymisen jälkeen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee toimittaa lääkärinlausunto Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallintoon. Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika on päätynyt, tarvitaan myös ilmailulääkärin tarkastus. Tämän jälkeen lääketieteellinen kelpoisuustodistus voidaan saattaa uudelleen voimaan.

Lisätietoja saatte tarvittaessa Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon ilmailulääketieteen jaoksesta (AMS) puh. (09) 8277 2441 klo 9-15.

Kari Antila, LKT, dos.
Ilmailulaitoksen asiantuntijalääkäri